

PERFIL EPIDEMIOLÓGICO DOS PACIENTES NO HOPITAL DO CORAÇÃO DE CARUARU-PE

Roberta Kelly Honorato Ferreira¹, Monique Lima Vieira², Niedja Gomes Pessoa da Silva³, Bruno Tácito de Souza Oliveira⁴, Adriana Siqueira de Oliveira⁵, Fernanda de Oliveira Soares Urbano⁶.

^{1,2,3}Graduada em fisioterapia da Associação Caruaruense de Ensino Superior (ASCES), ⁴ Preceptor de estágio supervisionado (ASCES), ⁵ Docente do curso de fisioterapia(ASCES),
email:roberta.fisioterapia@hotmail.com

Introdução: As doenças cardiovasculares(DCV) constituem a maior causa de morbimortalidade no mundo ocidental, Dados epidemiológicos auxiliam campanhas de prevenção em saúde pública. **Objetivo:** Traçar o perfil epidemiológico dos pacientes internados no Hospital do Coração de Caruaru-PE. **Materiais e métodos:** Realizada observação indireta por análise de prontuários de pacientes internados no Hospital do Coração de Caruaru-PE, durante o período de Julho à Dezembro de 2009. **Resultados:** Avaliados 251 pacientes, sendo 52,6% do sexo masculino, faixa etária de 64 ± 18 anos, com tempo de internação média de 6 ± 4 dias e um total de 4,4% de óbitos. Os problemas cardíacos predominantes foram ICC 38,2%, IAM 16,3%, e a síndrome aguda coronariana 16,3%. As doenças metabólicas prevalentes foram Hipertensão arterial (HAS) 33,5%, Diabetes Mellitus (DM) 13,5%, sendo 17,1% HAS e DM associados. A queixa principal mais freqüente foi dor precordial 20,7%, dispnéia associada à dor precordial 16,7%, e associada a edema de membros inferiores 12,7%. Apenas 23,1% eram eupnéicos, 22,3% apresentava dispnéia em repouso e 17,5% em atividades leve/moderada intensidade. Quanto às alterações de pressão arterial 44,6% eram hipertensos e 2% hipotensos. Em relação à fração de ejeção (FE), 30,3% apresentaram baixo risco ($FE > 50\%$), sendo 13,9% alto risco ($FE < 35\%$). **Discussão:** O sexo masculino (52,6%) correspondeu ao maior percentual de internação hospitalar por DVC, semelhante à informações do DATASUS (2008). A hipertensão arterial (33,5%) e DM (13,5%) são os fatores de risco principais para desenvolvimento de DCV, aumentado em dobro o risco de morte quando comparados à população geral. Nos Estados Unidos, anualmente são atendidos nos serviços de emergência cerca de 7 milhões de indivíduos cuja queixa principal é dor precordial semelhante ao estudo atual. **Conclusão:** Para traçar o real perfil epidemiológico precisa-se de um intervalo de tempo maior de avaliação.

Palavras-chave: coração; doenças cardiovasculares; epidemiologia

Área: ciências da saúde: fisioterapia